

17.

Max 0/0/4

Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen  $4a = \frac{2a^2 - (-42)}{a - (-2)}$  där  $a$  är

tangeringspunktens  $x$ -koordinat

+1 A<sub>PL</sub>

med godtagbar fortsättning, t.ex. bestämmer den ena tangeringspunktens  $x$ -koordinat,  $a_1 = -7$  eller  $a_2 = 3$

+1 A<sub>PL</sub>

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar  
( $y = -28x - 98$ ) eller ( $y = 12x - 18$ )

+1 A<sub>PL</sub>

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4

+1 A<sub>K</sub>

*Se avsnittet Bedömda elevlösningar.*



### Delprov D

18.

Max 2/0/0

Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen  $\frac{3,7 \cdot 4,8}{2} \sin v = 6,5$

+1 E<sub>PL</sub>

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (t.ex.  $47^\circ$ )

+1 E<sub>PL</sub>

*Kommentar:* Även ett svar där båda vinklarna anges godtas.

19.

Max 2/0/0

Godtagbar ansats, bestämmer det allmänna uttrycket för funktionen,  
t.ex.  $f(x) = x^4 + C$

+1 E<sub>PL</sub>

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( $f(x) = x^4 - 343$ )

+1 E<sub>PL</sub>

20.

Max 1/1/0

- a) Godtagbart enkelt resonemang som styrker att Sabina har rätt, t.ex. resonemang baserat på argumentet att värdet hos konstanten  $A$  endast påverkar grafens läge i  $y$ -led

+1 E<sub>R</sub>

*Se avsnittet Bedömda elevlösningar.*



- b) Godtagbart välgrundat resonemang som styrker att Sabina har rätt, t.ex. resonemang baserat på argumentet att  $y'' = 8 - 12x^2$  är maximalt 8 eftersom termen  $-12x^2$  alltid är negativ eller noll

+1 C<sub>R</sub>

*Se avsnittet Bedömda elevlösningar.*



- 21.** **Max 2/5/0**
- a) Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen  $1250e^{0,012 \cdot t} = 2000$  +1 E<sub>M</sub>  
 med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (2049) +1 E<sub>M</sub>
- b) Godtagbar ansats, visar insikt om att funktionen ska deriveras, t.ex. genom att påbörja derivering av funktionen  $f$  +1 C<sub>B</sub>  
 med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar inklusive korrekt enhet (19 medlemmar/år) +1 C<sub>B</sub>
- c) Godtagbar ansats, bildar en differensfunktion t.ex.  
 $S = 1250e^{0,012 \cdot t} - (1250 + 16t)$  +1 C<sub>M</sub>  
 med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( $t = 15$ ) +1 C<sub>M</sub>  
 Lösningen (deluppgift a, b och c) kommuniceras på C-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4 +1 C<sub>K</sub>

*Se avsnittet Bedömda elevlösningar.*



- 22.** **Max 0/2/0**
- Godtagbar ansats, påbörjar ett välgrundat resonemang genom att använda en undersökningsmetod som kan ge väl underbyggda slutsatser, t.ex. undersöker på sin grafräknare om *derivatans* graf har några nollställen +1 C<sub>R</sub>  
 med godtagbart slutfört välgrundat resonemang med korrekt slutsats (t.ex. "Grafen till derivatan blir aldrig noll, så det är ingen terrasspunkt") +1 C<sub>R</sub>

*Se avsnittet Bedömda elevlösningar.*



- 23.** **Max 0/3/0**
- Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer vinklarna i triangeln  $BCD$  och någon av sidorna  $BC$  eller  $BD$  +1 C<sub>PL</sub>  
 med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (398 m) +1 C<sub>PL</sub>  
 Lösningen kommuniceras på C-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4 +1 C<sub>K</sub>

*Se avsnittet Bedömda elevlösningar.*



24.

Max 0/0/2

Godtagbar ansats, påbörjar ett välgrundat och nyanserat resonemang, t.ex. om varför derivatan är avtagande kring punkten där  $x = a$

+1 A<sub>R</sub>

med fortsatt välgrundat och nyanserat resonemang som förklarar varför en avtagande derivata innebär en negativ andraderivata i punkten där  $x = a$

+1 A<sub>R</sub>

*Se avsnittet Bedömda elevlösningar.*



25.

Max 0/0/2

Godtagbar ansats, inleder ett bevis genom att rita en triangel, införa en lämplig höjd och använda Pythagoras sats för att teckna två relevanta

ekvationer, t.ex. 
$$\begin{cases} c^2 = h^2 + (b-x)^2 \\ a^2 = h^2 + x^2 \end{cases}$$

+1 A<sub>R</sub>

med i övrigt godtagbart slutfört bevis

+1 A<sub>R</sub>

26.

Max 0/0/4

Godtagbar ansats, tecknar en i huvudsak korrekt volymfunktion i en variabel eller en korrekt volymfunktion i två variabler, t.ex.

$$V = 12(x+8)(y+10) - 8xy$$

+1 A<sub>M</sub>

med godtagbar fortsättning, tecknar en korrekt volymfunktion i en variabel,

t.ex. 
$$V = 12(x+8)\left(\frac{900}{x} + 10\right) - 8x \cdot \frac{900}{x}$$

+1 A<sub>M</sub>

med i övrigt godtagbar lösning inklusive verifiering av minimum med godtagbart svar (11000 cm<sup>3</sup>)

+1 A<sub>M</sub>

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4

+1 A<sub>K</sub>

*Se avsnittet Bedömda elevlösningar.*



## Uppgift 20a

## Elevlösning 20a.1 (1 ER)

a) Ja, Sabina har rätt då konstanten  $A$  bara påverkar var minimipunkten har sin  $y$ -koordinat

*Kommentar:* Elevlösningen visar ett enkelt godtagbart resonemang där det framgår att värdet på konstanten  $A$  endast påverkar minimipunktens läge i  $y$ -led. Resonemanget hade varit tydligare om det framgick att *hela grafen* förskjuts i  $y$ -led. Elevlösningen ges nätt och jämnt resonemangspoängen på E-nivå.

## Elevlösning 20a.2 (1 ER)

a) Ja hon har rätt. Extrempunkternas  $x$ -koordinater tas här  $f'(x)=0$ . Eftersom  $A$  är en konstant deriveras inte den, så  $f'(x)$  är alltid  $8x-4x^2$  oavsett  $A$ 's värde

*Kommentar:* Elevlösningen visar ett enkelt godtagbart resonemang. Frasen "deriveras inte den" är felaktig men kompenseras av resonemanget på sista raden. Elevlösningen ges resonemangspoängen på E-nivå.

## Uppgift 20b

## Elevlösning 20b.1 (0 poäng)

$$f(x) = 4x^2 - x^4$$

Påstående  $f''(x)$  är mindre än 10 för alla  $x$

$$f'(x) = 8x - 4x^3$$

$$f''(x) = 8 - 12x^2$$

Ja, i och med  $-12x^2$  går det inte att  
få det större än 10.

*Kommentar:* Elevlösningen bedöms inte ha en sådan kvalitet att den motsvarar en resonemangspoäng på C-nivå eftersom det inte förklaras på vilket sätt termen  $-12x^2$  påverkar andraderivatans värde. Elevlösningen ges noll poäng.

## Elevlösning 20b.2 (0 poäng)

Sabina har rätt då det högsta

värdet är 8.

$$f(x) = 4x^2 - x^4 \Rightarrow f'(x) = 8x - 4x^3 \Rightarrow f''(x) = 8 - 12x^2$$

*Kommentar:* Elevlösningen bedöms inte ha en sådan kvalitet att den motsvarar en resonemangspoäng på C-nivå eftersom det utan motivering påstås att största värdet är 8. Elevlösningen ges noll poäng.

Elevlösning 20b.3 (1 C<sub>R</sub>)

$$f'(x) = 8x - 4x^3 \quad f''(x) = 8 - 12x^2$$

Det stämmer. Eftersom  $12x^2$  alltid blir  
positivt så blir  $f''(x)$  mindre än 8.

*Kommentar:* Elevlösningen visar ett välgrundat resonemang trots att fallet då  $12x^2 = 0$  utelämnas. Lösningen ges nätt och jämnt resonemangspoängen på C-nivå.

## Uppgift 21

Elevlösning 21.1 (2 E<sub>M</sub>, 2 C<sub>B</sub>, 2 C<sub>M</sub> och 1 C<sub>K</sub>)

$$a) f(t) = 1250e^{0,012t}$$

$$2000 = 1250e^{0,012t}$$

$$\ln \frac{2000}{1250} = \ln e^{0,012t}$$

$$0,012t = \ln \frac{2000}{1250}$$

$$t = \frac{\ln \frac{2000}{1250}}{0,012} \approx 39 \quad \text{SVAR: } 2049$$

$$b) f'(t) = 1250 \cdot 0,012 e^{0,012t}$$

$$f'(2030) = f'(20) = 1250 \cdot 0,012 e^{0,012 \cdot 20} = 19$$

SVAR: 19 kr/år

$$c) y = 1250 + 16t - 1250e^{0,012t}$$

$$y' = 16 - 1250 \cdot 0,012 e^{0,012t}$$

$$16 = 1250 \cdot 0,012 e^{0,012t}$$

$$\frac{16}{1250 \cdot 0,012} = e^{0,012t}$$

$$\ln \frac{16}{1250 \cdot 0,012} = \ln e^{0,012t}$$

$$t = \frac{\ln \frac{16}{1250 \cdot 0,012}}{0,012} = 5,37$$

$$t = 5,37 \text{ år} \rightarrow 2,72$$

$$t = 0 \text{ år} \rightarrow 0$$


$$t = 15 \text{ år} \rightarrow -6,52 \quad \text{SVAR: } t = 15$$

*Kommentar:* Uppgiften är behandlad i sin helhet och lösningen korrekt. När det gäller kommunikation är lösningen strukturerad och möjligt att följa och förstå. I b)-uppgiften är skrivsättet  $f'(2030)$  felaktigt. I c)-uppgiften saknas  $y' = 0$  i redovisningen och det framgår inte att det är funktionsvärden som beräknas i slutet av lösningen. Trots dessa brister bedöms elevlösningen nätt och jämnt uppfylla kraven för kommunikationspoängen på C-nivå.

## Uppgift 22

## Elevlösning 22.1 (1 CR)

$$f(x) = x^3 + 0,03x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 + 0,03$$


Derivatans graf är alltid positiv utom då  $x=0$  för då är derivatan 0.  
Teckenväxling  $+0+$   
alltså är det en terrasspunkt  
Peder har rätt!

från grafräknaren

*Kommentar:* I lösningen studeras derivatans graf på grafräknaren. Undersökningsmetoden kan leda till välgrundade slutsatser, men eftersom fönsterinställningen är för grov framgår inte att derivatan saknar nollställe och en felaktig slutsats dras. Sammantaget ges lösningen den första resonemangspoängen på C-nivå.

## Elevlösning 22.2 (1 CR)

$$f(x) = x^3 + 0,03x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 + 0,03$$

$$3x^2 + 0,03 = 0$$

$$x^2 + 0,01 = 0$$

$$x^2 = -0,01$$

$$x = \pm \sqrt{-0,01} \text{ EREOR}$$

$$x = 0,1 \text{ ?}$$


x	0	0,1	0,2
f'(x)	+	0	+
f(x)	↗	TERRASS	↗

HAN HAR RÄTT!

*Kommentar:* Undersökningsmetoden (söka derivatans nollställe) är godtagbar eftersom den kan leda till välgrundade slutsatser, men eftersom beräkningen av derivatans nollställe inte är korrekt dras en felaktig slutsats. Sammantaget ges lösningen den första resonemangspoängen på C-nivå.

## Uppgift 23

## Elevlösning 23.1 (2 CPL)



$$\frac{y}{\sin 118^\circ} = \frac{133}{\sin 13^\circ}$$

$$y = 522,03$$

$$CA = z = 396$$

$$x^2 = z^2 + y^2 - 2zy \cos 49^\circ$$

$$x^2 = 158085,1849$$

$$x = 397,599$$

Svar: sträckan AB

är 398m

*Kommentar:* Elevlösningen är korrekt och behandlar uppgiften i sin helhet. När det gäller kommunikation anges inte vilka satser som används. Vidare framgår inte var vinklarna  $118^\circ$  och  $13^\circ$  är belägna och inte heller hur de beräknats. Ett mellanled i slutet av lösningen saknas. Lösningen bedöms inte uppfylla kraven för kommunikationspoäng på C-nivå. Sammantaget ges lösningen två problemlösningspoäng på C-nivå.



Elevlösning 23.2 (2 C<sub>PL</sub> och 1 C<sub>K</sub>)

$$\text{Vinkel D:s yttrevinkel } 180^\circ - 62^\circ = 118^\circ$$

$$\text{Vinkel DBC} = 180^\circ - 49^\circ - 118^\circ = 13^\circ$$

$$\text{Sinussatsen ger } \frac{133}{\sin 13} = \frac{BD}{\sin 49}$$

$$BD = \frac{133 \cdot \sin 49}{\sin 13}$$

$$BD = 446,214 \text{ m}$$

cosinussatsen ger

$$AB^2 = 263^2 + 446,2^2 - 2 \cdot 263 \cdot 446,2 \cdot \cos 62$$

$$AB^2 = 158090,65$$

$$AB = 397,6 \text{ m}$$

Svar (397,6 m)  
398 m

*Kommentar:* Elevlösningen är korrekt och behandlar uppgiften i sin helhet. När det gäller kommunikation saknas en figur och gradtecken på några ställen, men lösningen är i alla andra avseenden så tydligt redovisad att den är möjlig att följa och förstå. Sammantaget ges lösningen två problemlösningspoäng och en kommunikationspoäng på C-nivå.

## Uppgift 24

## Elevlösning 24.1 (0 poäng)

Den är negativ för den har en maximipunkt.

Första derivatan är ju  $= 0$ , och eftersom kurvan börjar luta nedåt efter extrempunkten så blir andra derivatan negativ

*Kommentar:* Elevlösningen visar ett resonemang där det inte framgår varför derivatan är avtagande kring punkten där  $x = a$ . Elevlösningen ges noll poäng.

Elevlösning 24.2 (1 A<sub>R</sub>)

Derivatans bestämmer lutningen i en punkt.



Lutningen i en vändpunkt är noll, vilket gör att derivatans graf visar denna punkt på x-axeln och fortsätter sedan nedåt eftersom följande punkter har negativ lutning.

Andraderivatans visar lutningen i derivatans graf och eftersom punkten  $a$  har negativ lutning i derivatans graf är punkten även negativ i andra derivatan.

*Kommentar:* Resonemanget omfattar endast intervallet  $x \geq a$  och anses därmed endast uppfylla kraven för en godtagbar ansats. Elevlösningen ges en resonemangspoäng på A-nivå.

Elevlösning 24.3 (2 A<sub>R</sub>)

Svar: Eftersom funktionen har en maximi  
så börjar derivatan positiv för att bli negativ



Derivatan  
 $k < 0$  alltså andraderivatan  
negativ

*Kommentar:* Lösningen visar en godtagbar ansats där det framgår varför derivatan är avtagande kring punkten där  $x = a$ . Däremot saknar figurerna förklarande text om varför en avtagande derivata innebär en negativ andraderivata. Elevlösningen anses trots denna brist nätt och jämnt uppfylla kraven för två resonemangspoäng på A-nivå.

## Uppgift 26

Elevlösning 26.1 (2 A<sub>M</sub>)


$$V = V_{\text{yttre}} - V_{\text{inre}}$$

$$V = 12 \left( \frac{900}{x} + 10 \right) (x + 8) - 900 \cdot 8$$

Grafräknaren ger då  $x = 27$ ,  $V = 11000$

Svar  $11000 \text{ cm}^3$

*Kommentar:* Elevlösningen leder fram till rätt svar men är knapphändig. När det gäller kommunikation saknas redovisning av hur volymfunktionen bestämts och hur det digitala verktyget använts. Det är därför oklart om grafräknarfunktionen inkluderar bestämning av minimum eller inte. Sammantaget bedöms elevlösningen uppfylla kraven för de två första modelleringspoängen på A-nivå.

Elevlösning 26.2 (2 A<sub>M</sub> och 1 A<sub>K</sub>)

Sålika delar

$$y = \frac{900}{x}$$

 $V_1 =$  Undre plattans volym

$$= 4(x+8) \cdot \left(4 + \frac{900}{x} + 6\right) = (4x+32) \left(10 + \frac{900}{x}\right)$$

$$= 40x + 3600 + 320 + \frac{28800}{x} = 40x + 3920 + \frac{28800}{x}$$

 $V_2 =$  Tjocka sidans volym

$$(x+8) \cdot 6 \cdot 8 = (6x+48) \cdot 8 = 48x + 384$$

 $V_3 =$  Smala kortsidans volym

$$4 \cdot 8 \cdot x = 32x$$

 $V_4 =$  Båda långsidornas volym

$$= 2 \cdot \frac{900}{x} \cdot 8 \cdot 4 = \frac{2 \cdot 28800}{x}$$

 $V_{\text{tot}} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 =$ 

$$40x + 3920 + \frac{28800}{x} + 384 + 48x + 32x + \frac{2 \cdot 28800}{x} =$$

$$120x + 86400 \cdot x^{-1} + 4304$$

$$V_{\text{tot}}'(x) = 120 - \frac{86400}{x^2}$$

$$120 - \frac{86400}{x^2} = 0$$

$$x^2 = 720, \quad x = \sqrt{720} \approx 26.83$$


$$V_{\text{tot}}''(x) = -86400 \cdot (-2) x^{-3}$$

$$V_{\text{tot}}''(26.83) = 86400 \cdot 2 \cdot (26.83)^{-3} > 0 \quad \text{Minpunkt!}$$

$$\Rightarrow V_{\text{tot}} = 120 \cdot 26.83 + 86400 \cdot 26.83^{-1} + 4304 = 10744 \text{ cm}^3$$

Svar 10,7 dm<sup>3</sup>

*Kommentar:* Uppgiften är löst i sin helhet där en i huvudsak korrekt volymfunktion ( $V_{\text{tot}}$ ) är tecknad förutom att delvolymen  $V_3$  är felaktig. Därmed ges den första modelleringspoängen men inte den andra. Eftersom lösningen fortsättningsvis är korrekt och det tidigare felet inte förenklar lösningen ges den tredje modelleringspoängen (följdfel, se sid. 3). När det gäller kommunikation är lösningen lätt att följa och förstå då den innehåller en tydlig figur, indexering och förklarande hjälptext. En algebraisk verifiering av minimum avslutar lösningen. Sammantaget bedöms elevlösningen uppfylla kraven för den första och den tredje modelleringspoängen på A-nivå och kommunikationspoängen på A-nivå.

Elevlösning 26.3 (3 A<sub>M</sub> och 1 A<sub>K</sub>)

Volymen fås av  
yttre volymen minus  
inre volymen


$$V = (x+8)(y+10) \cdot 12 - 8xy \quad \text{och} \quad x \cdot y = 900$$

$$V = (x+8) \left( \frac{900}{x} + 10 \right) \cdot 12 - 8x \cdot \frac{900}{x}$$

$$V = (x+8) \left( \frac{900}{x} + 10 \right) \cdot 12 - 7200$$

Ritar upp grafen på räknaren och bestämmer  
minpunkten

Minsta  
volymen är  
11 dm<sup>3</sup>



*Kommentar:* Uppgiften är löst i sin helhet och korrekt. När det gäller kommunikation redovisas tydligt hur funktionsuttrycket framtagits och det framgår även hur det digitala verktyget använts och att minimum är verifierat. Sammantaget bedöms elevlösningen uppfylla kraven för tre modelleringspoäng och en kommunikationspoäng på A-nivå.